



Профилактика сыпного тифа

- Ликвидация вшивости**
- Живая сыпнотифозная вакцина из ослабленного штамма риккетсий Провачека Е.**
- Живая комбинированная вакцина из штамма Е и антигенов риккетсий**
- Химическая сыпнотифозная вакцина из антигенов клеточной стенки риккетсий.**

Клиника болезни Брилля

- Болезнь Брилля протекает легче сыпного тифа, но у всех больных развивается типичный симptomокомплекс.
- Преобладают больные пожилого возраста.
- Начальный период – 3-4 дня, сопровождается умеренной интоксикацией в виде головной боли, нарушения сна, повышения Т до 38-39 С. Период разгаря не превышает 5-7 дней и характеризуется умеренной гипертермией 38-39 С ремиттирующего, реже постоянного типа
- Признаки поражения ЦНС выражены умерено: головная боль, бессонница, эйфоричность и повышенная говорливость. Сознание не нарушено, хотя могут быть кошмарные сны, ведения

БОЛЕЗНЬ БРИЛЛЯ-ЦИНССЕРА

- острые циклические инфекции, представляющие собой эндогенный рецидив эпидемического сыпного тифа, проявляющаяся нередко через многие годы и характеризующаяся спорадичностью заболевания при отсутствии вшивости, источника заражения и очаговости; развитием более легких форм с сохранением основного симptomокомплекса болезни

Педикулез: как избежать заражения и избавиться от вшей

Как обезопасить себя от вшей



- мойте тело и голову не реже одного раза в неделю



- меняйте нательное белье ежедневно, постельное – раз в неделю



- прогладьте белье после стирки горячим утюгом, чтобы убить микробы



- ежедневно расчесывайте волосы



- поддерживайте в чистоте не только нательное белье, но и верхнюю одежду



- не носите чужое белье, одежду, головные уборы, не пользуйтесь предметами личной гигиены другого человека



- регулярно осматривайте головы детей и взрослых, особое внимание затылочной и височной частям

профилактика

- Борьба с педикулезом
- Раннее выявление и изоляции больных
- Наблюдение за контактными лицами на протяжении 25 дней со дня госпитализации больного с ежедневной термометрией
- В эндемичных очагах, все лихорадящие свыше 5 дней больные подлежат провизорной госпитализации с 2-х кратным серологическим контролем крови
- В очаге проводится дезинфекция (камерная дезинсекция-обработка одежды)
- Возможно проведение **экстренной профилактики** в течении 10 дней доксициклином , тетрациклином, рифампицином



РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

Педикулез или вшивость – заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей – мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся его кровью.
Все вши узко специфичны, на человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая.

ПРОФИЛАКТИКА

Для предупреждения заражения вшами избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать правила личной гигиены, проводить регулярную уборку жилых помещений

При головном педикулёзе при обнаружении небольшого количества головных вшей (от 1 до 5 насекомых), ещё не успевших отложить яйца (гниды), можно использовать частый гребень для вычёсывания вшей из волос; при незначительном количестве платяных вшей – бельё можно прокипятить, а верхнюю одежду особенно швы и складки прогладить горячим утюгом

В тех случаях, когда насекомые уже отложили яйца, рекомендуется применять специальные инсектицидные средства – педикулициды, предназначенные для уничтожения вшей



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

- Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши
- Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения
- Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий
- После каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными: проведите осмотр головы ребенка

МЕРЫ БОРЬБЫ С ПЕДИКУЛЕЗОМ

- Приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка
- На диметиконе – с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах – с 5 лет
- Обработать волосистую часть головы средством в соответствии с прилагаемой инструкцией
- После этого вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид
- Надеть ребенку чистое белье и одежду
- ПостираТЬ постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром
- Осмотреть всех членов семьи и себя на присутствие вшей
- Повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 7-10 дней

Подробнее на www.rosпотребnadzor.ru

3. СЫПНОЙ ТИФ И ВАКЦИНЫ ПРОТИВ НЕГО

Сыпной тиф

— вызываемое риккетсиями Промацека общее острое инфекционное заболевание, передающееся от больного человека здоровому через вшей.

Возбудителем болезни являются риккетсии Промацека, которые представляют собой микроорганизмы, паразитирующие в клетках эндотелия кровеносных капилляров.

Инкубационный период от 6 до 23 дней, в среднем 10...14 дней.

Сыпной тиф — болезнь, протекающая с явлениями лихорадки, токсикоза, розеолезно-петехиальной сыпи, распространяющаяся при наличии вшивости.

Риккетсии в высушенных вшах сохраняются до 30 дней, в сухих фекалиях вшей — до 58 дней, в высушенном кишечнике вшей — до 60 дней.

Профилактика и лечение педикулеза

Советы родителям

Как не заразиться?



Мыться не
реже одного
раза в неделю



После мытья
менять нательное
и постельное
белье



Ежедневно
расчесывать
волосы



Стирать
постельные
принадлежности



Регулярно
проводить уборку
жилья

- Не разрешайте ребенку использовать чужую расческу, полотенце, головной убор, наушники, заколки, резинки для волос;
- Осматривайте всех членов семьи после их длительного отсутствия;
- После школы и садика осматривайте одежду и волосы ребенка;
- Внимательно осматривайте постельное белье во время путешествий;
- После каникул также осмотрите одежду и волосы ребенка.

Что еще?

Что делать при заражении?



1 Купите в аптеке
средство для
обработки
педикулеза



4 Удалите руками
или чистым
гребнем погибших
вшей и их яйца



7 Прогладьте
чистые вещи
горячим утюгом
с паром



2 Обработайте
волосистую часть
головы по
инструкции



5 Наденьте на
ребенка чистые
белье и одежду



8 Внимательно
осмотрите
всех членов
семьи и себя



3 Вымойте голову
шампунем или
детским мылом



6 Постирайте
постель и
одежду



9 Повторяйте
осмотр всех
членов семьи
каждые 10 дней
в течение месяца

Эффективные средства против педикулеза

Препараты на основе бензилбензоата, фосфорорганических соединений (малатион, фентион), диметиконов, kleарола, веществ растительного происхождения (анисового, гвоздичного масла и масла нима).